

# Chapitre VI : Limites et continuité



Samy Youssoufine

7 janvier 2026

**UM6P**

University  
Mohammed VI  
Polytechnic

**EMINES**  
School of Industrial Management

# Table des matières

<b>1</b>	<b>Définitions de base</b>	<b>2</b>
1.1	Adhérence . . . . .	2
1.2	Voisinage . . . . .	3
1.3	Limite d'une fonction . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Propriétés</b>	<b>9</b>
2.1	Caractérisation séquentielle de la limite . . . . .	9
2.2	Caractérisation séquentielle de la continuité . . . . .	10
2.3	Propriétés diverses . . . . .	10
2.4	Théorème d'encadrement . . . . .	13
2.5	Composée et continuité . . . . .	14
2.6	Fonctions <b>k</b> -Lipschitziennes . . . . .	14

# 1 Définitions de base

## 1.1 Adhérence

### Définition 1.1.1.1 (Adhérence)

Soit  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ . On note  $\bar{I}$  l'intervalle fermé contenant  $I$  et ayant les mêmes bornes que  $I$ .  $\bar{I}$  est appelé l'adhérence de  $I$ .

### Exemple 1.1.1.1

1. L'adhérence de l'intervalle ouvert  $]0, 1[$  est l'intervalle fermé  $[0, 1]$ . On note  $\overline{]0, 1[} = [0, 1]$ .
2. L'adhérence de l'intervalle  $]0, +\infty[$  est l'intervalle  $[0, +\infty[$ . On note  $\overline{]0, +\infty[} = [0, +\infty[$ .
3.  $\overline{]-\infty, 1[} = ]-\infty, 1]$ .
4. L'adhérence de l'intervalle  $]-\infty, +\infty[$  est lui-même :  $\overline{]-\infty, +\infty[} = ]-\infty, +\infty[$ .
5. L'adhérence de l'intervalle fermé  $[a, b]$  est lui-même :  $\overline{[a, b]} = [a, b]$ . On peut écrire  $I$  fermé  $\implies \bar{I} = I$ .

### Remarque 1.1.1.1

On a  $x_0 \in \bar{I} \iff \exists (a_n)_n \in I^{\mathbb{N}}$  tel que  $a_n \rightarrow x_0$ .

### Q Preuve

- ⇒
- Si  $x_0 \in I$ , on peut définir la suite constante  $a_n = x_0$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Alors,  $a_n \rightarrow x_0$  et  $a_n \in I$  pour tout  $n$ .
  - Dans le cas contraire,  $x_0$  est une borne de  $I$ . Alors, d'après la caractérisation séquentielle des bornes sup./inf., il existe une suite  $(a_n)_n \in \mathbb{I}^{\mathbb{N}}$  telle que  $a_n \rightarrow x_0$ .
- ⇐ Soient  $\alpha = \sup I$  et  $\beta = \inf I$ . On a  $\forall n \in \mathbb{N}, \beta \leq a_n \leq \alpha$ . Par passage à la limite, on obtient  $\beta \leq x_0 \leq \alpha$ , donc  $x_0 \in \bar{I}$ . Si les inégalités sont strictes, alors elles deviennent larges par passage à la limite. ■

## 1.2 Voisinage

### ☰ Définition 1.1.2.2 (Voisinage)

Soit  $a \in \mathbb{R}$ . On appelle voisinage de  $a$  toute partie de  $\mathbb{R}$  contenant un intervalle de type  $]a - r, a + r[$ , où  $r > 0$ . On note  $\mathcal{V}(a)$  l'ensemble des voisinages de  $a$ .

#### 🗨 Remarque 1.1.2.2

- ▶  $\mathbb{R}$  est un voisinage de tout réel  $a$ .
- ▶  $\mathcal{V}(a)$  est un ensemble de parties ("ensemble d'ensembles") de  $\mathbb{R}$ . On dit qu'un ensemble  $V \in \mathcal{V}(a)$  si et seulement si  $V$  est un voisinage de  $a$ .
- ▶ On appelle voisinage de  $+\infty$  toute partie de  $\mathbb{R}$  contenant un intervalle de type  $]M, +\infty[$ , où  $M \in \mathbb{R}$ . On note  $\mathcal{V}(+\infty)$  l'ensemble des voisinages de  $+\infty$ .
- ▶ On appelle voisinage de  $-\infty$  toute partie de  $\mathbb{R}$  contenant un intervalle de type  $] - \infty, M[$ , où  $M \in \mathbb{R}$ . On note  $\mathcal{V}(-\infty)$  l'ensemble des voisinages de  $-\infty$ .

#### 🗨 Remarque 1.1.2.3

- ▶ Soit  $a \in \mathbb{R}$ . On a  $V \in \mathcal{V}(a) \iff \exists r > 0$  telle que  $B(a, r) \subseteq V$ , où  $B(a, r) = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - a| < r\}$  est une "boule ouverte".
- ▶ Si  $a \in \mathbb{C}$ , on a  $V \in \mathcal{V}(a) \iff \exists r > 0$  telle que  $B(a, r) \subseteq V$ , où  $B(a, r) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - a| < r\}$  est un disque.

 **Exemple 1.1.2.2**

1.  $[0, +\infty[ \in \mathcal{V}(1)$ , mais  $[0, +\infty[ \notin \mathcal{V}(0)$ .
2.  $\mathbb{R}^* \in \mathcal{V}(+\infty)$  et  $\mathbb{R}^* \in \mathcal{V}(-\infty)$ .

Dans le suite de ce chapitre, et sauf mention contraire,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  désignera une fonction définie sur un intervalle  $I$  de  $\mathbb{R}$  **non vide**. On peut noter  $f \in \mathbb{R}^I$ . On utilise la notation :  $\bar{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$ .

## 1.3 Limite d'une fonction

 **Définition 1.1.3.3**

1. **Limite finie en un point fini** : Soit  $a \in \bar{I}$ . On dit que  $f \rightarrow l$  lorsque  $x \rightarrow a$  si et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I : |x - a| < \delta \implies |f(x) - l| < \varepsilon.$$

2. **Limite infinie (+) en un point fini** : Soit  $a \in \bar{I}$ . On dit que  $f \rightarrow +\infty$  lorsque  $x \rightarrow a$  si et seulement si :

$$\forall M > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I : |x - a| < \delta \implies f(x) > M.$$

3. **Limite infinie (-) en un point fini** : Soit  $a \in \bar{I}$ . On dit que  $f \rightarrow -\infty$  lorsque  $x \rightarrow a$  si et seulement si :

$$\forall M < 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I : |x - a| < \delta \implies f(x) < M.$$

Si  $I = [\alpha, +\infty[$

4. On dit que  $f \rightarrow l$  lorsque  $x \rightarrow +\infty$  si et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in I : x > B \implies |f(x) - l| < \varepsilon.$$

5. **Limite infinie (+)** : On dit que  $f \rightarrow +\infty$  lorsque  $x \rightarrow +\infty$  si et seulement si :

$$\forall A > 0, \exists B > 0, \forall x \in I : x > B \implies f(x) > A.$$

6. **Limite infinie (-)** : De même pour  $f \rightarrow -\infty$  lorsque  $x \rightarrow +\infty$ .

 **Remarque 1.1.3.4**

On peut généraliser les définitions précédentes en une unique définition en utilisant la notion du voisinage.

Soient  $a \in \bar{\mathbb{I}} \cup \{\pm\infty\}$  et  $l \in \bar{\mathbb{R}}$ .

On dit que  $f$  tend vers  $l$  en  $a$  lorsque :

$$\forall W \in \mathcal{V}(l), \exists V \in \mathcal{V}(a), \forall x \in I, x \in V \implies f(x) \in W \iff f(I \cap V) \subseteq W$$

 **Exemple 1.1.3.3**

Pour  $a = -\infty$  et  $I = ]-\infty, \beta]$ ,  $l = +\infty$ , on a :

$$\forall W = ]A, +\infty[ \in \mathcal{V}(+\infty) \quad (A > 0)$$

$$\exists V = ]-\infty, B[ \in \mathcal{V}(-\infty) \quad (B > 0)$$

$$\forall x \in I, x \in V \implies f(x) \in W \iff x < B \implies f(x) > A.$$

Cela revient (équivalence) à démontrer que

$$\forall A > 0, \exists B > 0, \forall x \in I, x < B \implies f(x) > A.$$

Donc  $f \rightarrow +\infty$  lorsque  $x \rightarrow -\infty$ .

 **Propriété 1.1.3.1 (Unicité de la limite)**

Soient  $a \in \bar{\mathbb{I}} \cup \{\pm\infty\}$  et  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ . Si  $f$  tend vers  $l$  en  $a$ , alors  $l$  est unique.

 **Définition 1.1.3.4**

$l$  est appelé la **limite** de  $f$  en  $a$ . On note :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$$

$$\lim_a f = l$$

$$f \xrightarrow[a]{} l$$

**Q Preuve**

Supposons que  $a \in \bar{I}$  et  $l \in \mathbb{R}$ . Supposons que  $f \xrightarrow{a} l$  et  $f \xrightarrow{a} l'$ .

On a donc  $\forall \varepsilon > 0$ ,  $\begin{cases} \exists \eta_1 > 0, \forall x \in I : |x - a| < \eta_1 \implies |f(x) - l| < \frac{\varepsilon}{2} \\ \exists \eta_2 > 0, \forall x \in I : |x - a| < \eta_2 \implies |f(x) - l'| < \frac{\varepsilon}{2} \end{cases}$

Soit  $x \in I$  tel que  $|x - a| < \eta = \min(\eta_1, \eta_2)$ . On a donc :

$$\begin{aligned} |l - l'| &= |l - f(x) + f(x) - l'| \\ &\leq |l - f(x)| + |f(x) - l'| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

Cela veut donc dire que :

$$\forall \varepsilon > 0, |l - l'| < \varepsilon$$

Possible uniquement si  $l - l' = 0 \iff \boxed{l = l'}$ . D'où l'unicité de la limite. CQFD. ■

**☰ Définition 1.1.3.5 (Limites à gauche et à droite)**

Soient  $a \in \bar{I}$  et  $f \in \mathbb{R}^I$ . On appelle la limite à droite de  $f$  en  $a$  la limite de la fonction  $f$  lorsque  $x$  tend vers  $a$  par des valeurs supérieures à  $a$ , ou encore la limite de la restriction de  $f$  à  $I \cap ]a, +\infty[$  (qu'on peut noter  $f_{|I \cap ]a, +\infty[}$ ) en  $a$ . On la note :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \text{ ou } \lim_{x \rightarrow a^+}^> f(x)$$

On appelle la limite à gauche de  $f$  en  $a$  la limite de la fonction  $f$  lorsque  $x$  tend vers  $a$  par des valeurs inférieures à  $a$ , ou encore la limite de la restriction de  $f$  à  $I \cap ]-\infty, a[$  (qu'on peut noter  $f_{|I \cap ]-\infty, a[}$ ) en  $a$ . On la note :

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \text{ ou } \lim_{x \rightarrow a^-}^< f(x)$$

**🗨 Remarque 1.1.3.5**

Il n'est pas incorrect de considérer la limite de la fonction restreinte à  $[a, +\infty[$  (resp.  $]-\infty, a]$ ) en  $a$  (intervalle fermé). Cela s'explique par le fait que  $a$  appartient à l'adhérence de  $I \cap ]a, +\infty[$  (resp.  $I \cap ]-\infty, a]$ ).

On dit que  $f$  admet une limite en  $a$  si et seulement si  $f$  admet une limite à droite et à gauche en  $a$ , et que ces deux limites sont égales. On peut noter cette limite par :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

**Remarque 1.1.3.6**

On peut noter la restriction d'une fonction à un ensemble  $A$  par  $f|_A$ .

**Définition 1.1.3.6 (Continuité)**

Soit  $a \in I$ . On dit que  $f$  est **continue en  $a$**  lorsque  $f$  admet une limite réelle en  $a$  et que :

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

On peut aussi écrire  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in I : |x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon$ .

**Définition 1.1.3.7**

Soit  $a \in \overset{\circ}{I}$ . On dit que  $f$  est **continue à droite en  $a$**  lorsque  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$ . On dit que  $f$  est **continue à gauche en  $a$**  lorsque  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$ . On dit que  $f$  est continue en  $a$  si et seulement si  $f$  est continue à droite et à gauche en  $a$ .

**Définition 1.1.3.8**

On dit que  $f$  est **continue sur  $I$**  si et seulement si  $f$  est continue en tout point de  $I$ . Autrement dit :

$$\forall a \in I, \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

On note  $\mathcal{C}^0(I, \mathbb{R})$  l'ensemble des fonctions continues de  $I$  vers  $\mathbb{R}$ .

**Exemple 1.1.3.4**

1. Les polynômes sont continus sur  $\mathbb{R}$ .
2. Les fonctions  $\sin, \cos, \exp$  sont continues sur  $\mathbb{R}$ .
3. La fonction  $f : x \mapsto E(x)$  est continue en tout point de  $\mathbb{R} - \mathbb{Z}$ .

**Démonstration :**

**Exercice 1.1.3.1**

Soit  $f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto E(x) \cdot \sin(\pi x) \end{cases}$  ; Montrer que  $f$  est continue en tout point de  $\mathbb{R}$ .

**Solution :**

**Définition 1.1.3.9 (Prolongement par continuité)**

Soient  $a \in \bar{I}$  et  $f \in \mathbb{R}^{I-a}$ . On dit que  $f$  **admet un prolongement par continuité** ou qu'elle est prolongeable par continuité en  $a$  si et seulement si  $f$  admet une limite

A  
com-  
ple-  
ter

A  
com-  
ple-  
ter

finie en  $a$ . Dans ce cas, on peut définir une fonction  $\tilde{f} : I \rightarrow \mathbb{R}$  par :

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq a \\ \lim_{x \rightarrow a} f(x) & \text{si } x = a \end{cases}$$

La fonction  $\tilde{f}$  est appelée le **prolongement par continuité** de  $f$  en  $a$ , et  $\tilde{f}$  est continue en  $a$ .

 **Exemple 1.1.3.5**

$f : \begin{cases} \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{\sin(x)}{x} \end{cases}$  admet un prolongement par continuité en 0. En effet,

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$ . On peut donc définir  $\tilde{f} : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases} \end{cases}$ , qui est continue en 0.

# 2 Propriétés

## 2.1 Caractérisation séquentielle de la limite

### ★ Théorème 2.2.1.1 (Caractérisation séquentielle de la limite)

Soient  $a \in \bar{\mathbb{I}} \cup \pm\infty$  et  $l \in \bar{\mathbb{R}}$ . On a :

#### 🔑 Formule clé

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \iff \forall (u_n)_n \in \mathbb{I}^{\mathbb{N}}, u_n \rightarrow a \implies f(u_n) \rightarrow l$$

#### 🔍 Preuve

$$\implies f \xrightarrow{a} l \quad (a \in \bar{\mathbb{I}}, l \in \bar{\mathbb{R}})$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in \mathbb{I}, |x - a| < \eta \implies |f(x) - l| < \varepsilon$$

Soit  $(u_n)_n \in \mathbb{I}^{\mathbb{N}}$  telle que  $u_n \rightarrow a$ .

$$\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |u_n - a| < \eta$$

$$\text{Donc, } \forall n \geq n_0, |f(u_n) - l| < \varepsilon$$

$$\implies f(u_n) \rightarrow l.$$

$$\Leftarrow \text{Supposons que } \lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq l.$$

$$\exists \varepsilon > 0, \forall \eta > 0, \exists x_\eta \in \mathbb{I}, |x_\eta - a| < \eta \text{ et } |f(x_\eta) - l| \geq \varepsilon.$$

Pour  $\eta = \frac{1}{n+1}$ ,  $\exists (x_n)_n \in \mathbb{I}^{\mathbb{N}}$  telle que  $|x_n - a| < \frac{1}{n+1}$  et  $|f(x_n) - l| \geq \varepsilon$ .

Donc,  $x_n \rightarrow a$  mais  $f(x_n) \not\rightarrow l$ . Contradiction. Donc,  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ .

► Raisonement analogue pour les autres cas de  $a$  et  $l$ . ■

## 2.2 Caractérisation séquentielle de la continuité

### ★ Théorème 2.2.2.2 (Caractérisation séquentielle de la continuité)

Soient  $a \in I$ . La fonction  $f$  est continue en  $a$  si et seulement si :

#### 🔑 Formule clé

$$\forall (u_n)_n \in \mathbb{I}^{\mathbb{N}}, u_n \rightarrow a \implies f(u_n) \rightarrow f(a)$$

La preuve de ce théorème est analogue à celle du théorème précédent.

## 2.3 Propriétés diverses

### ✔ Propriété 2.2.3.2 (Bornitude locale)

Soit  $a \in \bar{I} \cup \{\pm\infty\}$ .

Si  $f$  admet une limite réelle en  $a$ , alors  $f$  est bornée dans un voisinage de  $a$ .

#### 🔍 Preuve

Supposons que  $f \xrightarrow{a} l$  avec  $l \in \mathbb{R}$ .

$\forall \varepsilon > 0, \exists V \in \mathcal{V}(a), \forall x \in I \cap V, |f(x) - l| < \varepsilon$

Pour  $\varepsilon = 1$ , on a  $\exists V \in \mathcal{V}(a), \forall x \in I \cap V, |f(x) - l| < 1$

$\implies \forall x \in I \cap V, l - 1 < f(x) < l + 1$

Donc,  $f$  est bornée dans le voisinage  $V$  de  $a$ . CQFD. ■

### ✔ Propriété 2.2.3.3 (Valeurs absolues)

Soient  $a \in \bar{I} \cup \{\pm\infty\}$  et  $l \in \bar{\mathbb{R}}$ .

1.  $|f| \xrightarrow{a} 0 \iff f \xrightarrow{a} 0$ .

2.  $f \xrightarrow{a} l \implies |f| \xrightarrow{a} |l|$ .

La réciproque de cette dernière est fautive (démonstration triviale par contre-exemple).

**Q Preuve**

1.  $\Rightarrow$  Supposons que  $|f| \xrightarrow{a} 0$ .

$$\forall \varepsilon > 0, \exists V \in \mathcal{V}(a), \forall x \in I \cap V, ||f(x)| - 0| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \forall x \in I \cap V, |f(x)| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \forall x \in I \cap V, |f(x) - 0| < \varepsilon$$

Donc,  $f \xrightarrow{a} 0$ .

$\Leftarrow$  Supposons que  $f \xrightarrow{a} 0$ .

$$\forall \varepsilon > 0, \exists V \in \mathcal{V}(a), \forall x \in I \cap V, |f(x) - 0| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \forall x \in I \cap V, |f(x)| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \forall x \in I \cap V, ||f(x)| - 0| < \varepsilon$$

Donc,  $|f| \xrightarrow{a} 0$ .

2. On utilise la propriété stipulant que  $||f(x)| - |l|| \leq |f(x) - l|$  (inégalité triangulaire). ■

**✓ Propriété 2.2.3.4 (Bornitude et produit)**

Soient  $f, g \in \mathbb{R}^I$  et  $a \in \bar{I} \cup \{\pm\infty\}$ .

**🔑 Formule clé**

$$\begin{cases} g \text{ est bornée au } \mathcal{V}(a) \\ f \xrightarrow{a} 0 \end{cases} \Rightarrow (f \cdot g) \xrightarrow{a} 0$$

**Q Preuve**

$g$  est bornée au  $\mathcal{V}(a) \Rightarrow \exists M > 0, \exists V_1 \in \mathcal{V}(a), \forall x \in I \cap V_1, |g(x)| \leq M$

$f \xrightarrow{a} 0 \Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists V_2 \in \mathcal{V}(a), \forall x \in I \cap V_2, |f(x) - 0| < \frac{\varepsilon}{M}$

Soit  $V = V_1 \cap V_2 \in \mathcal{V}(a)$

$\forall x \in I \cap V, |(f \cdot g)(x) - 0| = |f(x) \cdot g(x)| = |f(x)| \cdot |g(x)| < \frac{\varepsilon}{M} \cdot M = \varepsilon$

Donc,  $(f \cdot g) \xrightarrow{a} 0$ . CQFD. ■

**✓ Propriété 2.2.3.5**

Soient  $f, g \in \mathbb{R}^I$  et  $a \in \bar{I} \cup \{\pm\infty\}$ .

 **Formule clé**

$$\begin{cases} |f - l| \leq |g| \text{ au } \mathcal{V}(a) \\ g \xrightarrow{a} 0 \end{cases} \implies f \xrightarrow{a} l$$

 **Preuve**

- ▶ On a  $\exists V_1 \in \mathcal{V}(a), \forall x \in I \cap V_1, |f(x) - l| \leq |g(x)|$ .
- ▶  $\forall \varepsilon > 0, \exists V_2 \in \mathcal{V}(a), \forall x \in I \cap V_2, |g(x) - 0| < \varepsilon$ .
- ▶ On pose  $V = V_1 \cap V_2 \in \mathcal{V}(a)$ .
- ▶  $\forall x \in I \cap V, |f(x) - l| \leq |g(x)| < \varepsilon$ .
- ▶ Donc,  $f \xrightarrow{a} l$ . CQFD. ■

 **Propriété 2.2.3.6 (Bornitude et limite)**

Soient  $f \in \mathbb{R}^I$  et  $a \in \bar{I} \cup \{\pm\infty\}$ .

Si  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$ , avec  $\alpha < l < \beta$ , alors  $f$  est comprise entre  $\alpha$  et  $\beta$  dans un voisinage de  $a$ . On peut écrire

$$\exists V \in \mathcal{V}(a), \forall x \in I \cap V, \alpha < f(x) < \beta.$$

 **Preuve**

On a (globalement)  $\alpha < l - \varepsilon < f(x) < l + \varepsilon < \beta$ .

Soit  $\varepsilon = \min(l - \alpha, \beta - l) > 0$ .

$\exists V \in \mathcal{V}(a), \forall x \in I \cap V, |f(x) - l| < \varepsilon$

$\implies \forall x \in I \cap V, -\varepsilon < f(x) - l < \varepsilon$

$\implies \forall x \in I \cap V, l - \varepsilon < f(x) < l + \varepsilon$

$\implies \forall x \in I \cap V, \alpha < f(x) < \beta$ . CQFD. ■

 **Conséquence 2.2.3.1**

Si  $f \xrightarrow{a} l$  avec  $l > 0$ , alors  $\exists V \in \mathcal{V}(a)$  tel que  $\forall x \in I \cap V, f(x) > \frac{l}{2} > 0$ .

✓ **Propriété 2.2.3.7**

Soient  $f, g \in \mathbb{R}^I$ ,  $(l, l') \in \mathbb{R}^2$  et  $a \in \bar{I} \cup \{\pm\infty\}$ .

1.  $\begin{cases} f \xrightarrow{a} l \\ g \xrightarrow{a} l' \end{cases} \implies \begin{cases} (f + g) \xrightarrow{a} (l + l') \\ (f \cdot g) \xrightarrow{a} (l \cdot l') \end{cases}$ .
2. Si  $l \neq 0$ , alors  $\frac{1}{g} \xrightarrow{a} \frac{1}{l}$ . Donc  $\frac{f}{g} \xrightarrow{a} \frac{l}{l'}$ .

🔍 **Preuve**

À reprendre en tant qu'exercice. ■

➔ **Conséquence 2.2.3.2 (Opération sur les fonctions continues)**

Soient  $f, g \in \mathbb{R}^I$  continues sur  $I$ .

1. a)  $\forall a \in \mathbb{R}, f + \alpha g$  est continue sur  $I$ .  
b)  $fg$  est continue sur  $I$ .
2. Si  $g$  ne s'annule pas sur  $I$ , alors  $\frac{f}{g}$  est continue sur  $I$ . On peut aussi en déduire que  $\frac{f}{g}$  est continue sur  $I$ .

## 2.4 Théorème d'encadrement

★ **Théorème 2.2.4.3**

Soient  $f, g, h \in \mathbb{R}^I$  et  $a \in \bar{I} \cup \{\pm\infty\}$ .

🔑 **Formule clé**

$$\begin{cases} f \leq g \leq h \text{ au } \mathcal{V}(a) \\ f \xrightarrow{a} l \\ h \xrightarrow{a} l \end{cases} \implies g \xrightarrow{a} l$$

🔍 **Preuve**

- ▶ On a (i) :  $\exists V_1 \in \mathcal{V}(a), \forall x \in I \cap V_1, f(x) \leq g(x) \leq h(x)$  (première hypothèse).
- ▶ On a (ii) :  $\forall \varepsilon > 0, \{$

faut  
reco-  
pier...

✓ **Propriété 2.2.4.8 (Limite et inégalité)**

Soient  $a \in \bar{I} \cup \{\pm\infty\}$  et  $f, g \in \mathbb{R}^I$  telles que  $f \leq g$  sur un  $\mathcal{V}(a)$ .

1. Si  $f \xrightarrow{a} +\infty$ , alors  $g \xrightarrow{a} +\infty$ .
2. Si  $g \xrightarrow{a} -\infty$ , alors  $f \xrightarrow{a} -\infty$ .

⚡ **Exercice 2.2.4.2**

Soit  $f \in \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$  telle que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \in \bar{\mathbb{R}}$ . Montrer que  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = l$ .

A  
faire  
pour  
le  
21/11

## 2.5 Composée et continuité

✓ **Propriété 2.2.5.9 (Composée de fonctions continues)**

Soient  $I, J$  des intervalles de  $\mathbb{R}$  tels que  $\overset{\circ}{I} \cap \overset{\circ}{J} \neq \emptyset$ ,  $f \in \mathbb{R}^I$  et  $g \in \mathbb{R}^J$  continues et tel que  $g(J) \subseteq I$ . Soient  $a \in J \cup \{\pm\infty\}$  et  $b \in I \cup \{\pm\infty\}$  et  $l \in \bar{\mathbb{R}}$ .

1. Si  $f \xrightarrow{b} l$  et  $g \xrightarrow{a} b$ , alors  $(f \circ g) \xrightarrow{a} l$ .

🔍 Preuve

## 2.6 Fonctions $k$ -Lipschitziennes

📖 **Définition 2.2.6.10**

Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  tel que  $\overset{\circ}{I} \neq \emptyset$  et  $k \in \mathbb{R}^+$ . On dit que  $f \in \mathbb{R}^I$  est  **$k$ -Lipschitzienne** si et seulement si :

$$\forall (x, y) \in I^2, |f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$$

Si  $k \in [0, 1[$ , on dit que  $f$  est  **$k$ -contractante**.

 **Propriété 2.2.6.10**

Toute fonction  $k$ -Lipschitzienne est continue sur  $I$ .

 **Preuve**

- ▶ Soit  $a \in I$ .
- ▶ On a  $\forall x \in I, |f(x) - f(a)| \leq k|x - a| \rightarrow 0$  lorsque  $x \rightarrow a$ .
- ▶ Donc,  $f$  est continue en  $a$ . CQFD. ■

 **Exercice 2.2.6.3**

Soit  $A$  une partie non-vide de  $\mathbb{R}$ . On pose  $f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \inf\{|x - y|, y \in A\} = d(x, A) \end{cases}$ .

Montrer que  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}$ .

**Solution :**

Le but est de montrer que cette fonction est 1-Lipschitzienne. Soient  $x, y \in \mathbb{R}$ .

$$\begin{aligned} \forall a \in A, f(x) = \inf_{z \in A} |x - z| &\leq |x - a| \\ &\leq |x - y + y - a| \\ \forall a \in A, f(x) &\leq |x - y| + |y - a| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \implies \forall a \in A, f(x) - |x - y| &\leq |y - a| \\ \implies f(x) - |x - y| &\text{ est un minorant de } \{|y - a|, a \in A\} \\ \implies f(x) - |x - y| &\leq \inf\{|y - a|, a \in A\} = f(y) \\ \implies f(x) - f(y) &\leq |x - y| \end{aligned}$$

En échangeant  $x$  et  $y$ , on obtient aussi :  $f(y) - f(x) \leq |y - x| = |x - y|$  En combinant les deux inégalités, on obtient :  $|f(x) - f(y)| \leq |x - y|$  Donc,  $f$  est 1-Lipschitzienne, donc continue sur  $\mathbb{R}$ .